

Esemplari di uccelli imbalsamati
Conservati nel museo della scuola





Fanello

Acanthis cannabina

vive nei cespugli vicino ai corsi d'acqua.
Ha un canto molto bello, è granivoro.
A primavera sosta in montagna o in collina,
in autunno si sposta in pianura,
frequentando zone aperte appena sennò in coppie.
Ad inizio ottobre
i branchi divengono particolarmente
per l'arrivo dei soggetti che vengono

Ortolano

Emberiza hortulana

... "cacciato" di verde-oliva chiara
... Plumaggio bruno-rossiccio
... becco rosato; fianchi fittamente
... alpebrale giallo. Femmina bruno-
... striato. Preferisce terreni collinari
... pingue anche in pianura e nei giardini.
... no al terreno tra erbacce e graminacee.
...ipelago Toscano è segnalato sporadicamente,
... ne fonti lo danno però come possibile nidificante

PASSERIFORMI
Fringillidi
Emberiza schoeniclus
migliarino palude

PASSERIFORMI
Fringillidi
Carduelis cannabina
fanello

palude

nicus

lunghe e coda diritta.
maschio ha capo e gola neri,
arino dello stesso colore sulla

ra. Ventre grigio-biancastro.
s con lo stesso disegno
sopraciglio biancastri,
n petto e fianchi striati di nero.
e stagni, canneti, paludi,
ta campagna.
anche sul terreno.

ro

. 1766)

Emberizidae

c, da 17 a 25 g di peso

una banda olivastro

lore bruno olivastro

sulla gola.

e incurvato

lo così

l'aspetto

gola

Il verdone

(*Carduelis chloris chloris*, Linnaeus 1758)

è un uccello della famiglia dei fringillidi

Ha un becco lungo alla base, corto e duro, è di colore verde con sfumature

sul ventre, sulla groppa, sulle ali e coda,

di e coda, la femmina è meno colorata,

molto meno bruno giallo.

colore bruno/verde con striature più scure,

e perdono alla prima muta.

m di lunghezza, ed il peso di circa 25 grammi

in Africa del nord e in Asia minore, e tutta Italia.

anche se predilige le zone al di sopra dei 1000 metri s.l.m.

gli uccelli granivori si nutre di semi,

particolare preferenza per i semi oleosi,

insetto o verme, specie nel periodo della riproduzione.

nidifica sui tronchi più grandi degli alberi,

costruendo un nido non molto elaborato,

con un interno ben imbottito, in cui depone

3-5 uova, ma sono stati trovati nidi anche con 7-8

PASSERIFORMI

Fringillidi

Carduelis can

fanella

PASSERIFORMI

Fringillidi

Emberiza palustris

PASSERIFORMI

Fringillidi

Emberiza hortulana

LEUCISIA

Leucis curvirostris

in suo nome deriva dal becco lungo che ha la parte inferiore rivolta verso l'alto e la superiore verso il basso, incrociandosi. Questa forma del becco gli permette di estrarre con facilità i semi dalle pigne. Si trova nei boschi di abeti dove svolge anche la funzione di disseminatore, lasciando i semi ai bordi dei boschi.

Zigolo giallo

Emberiza hortolana (L. 1758)

Emberizidae

Africa del Nord

comuni

I colori principali sono il giallo (sulle parti superiori) e il rosso (sulle parti inferiori). Il giallo sul ventre è molto intenso. Lo si trova in tutta l'Africa del Nord. Non si trova sugli alberi.

Zigolo marmorato

Emberiza hortolana

Uccello inconfondibile per le strisce nere sulla testa che si estende al collo. Femmina ben appariscente per i rocciosi delle parti superiori.

PASSERIFORMES
Fringillidae
Emberiza hortolana
Emberiza hortolana
Emberiza hortolana

Coccothraustes

Coccothraustes



Codirossone
Monticola saxatilis

In estate maschio ha un vistoso abito nu...
testa e collo di colore blu-lavagna chiaro...
sui dorso. Groppone bianco. Ali nerastr...
inferiori e coda sono castano arancio. In...
colori sono più tenui e macchiettati. A...
femmina ha la coda di colore castano, a...
dorso con tracce di bianco. Il resto del p...
marrone punteggiato di macchie biancast...
sulle zone rocciose ed aperte di alta mont...
raramente anche tra alberi e rovine. Nell'A...
Toscana è nidificante solo sulle montagne

Pettirosso
Erithacus rubecola

vivacissimo e curioso ha la fronte, i...
la gola ed il petto rosso ara...
Le parti superiori sono di un colore bru...
l'addome è bianco.
Si ciba di insetti, larve e ba...
In estate vive nei bosch...
mentre in autunno su trasfe...
nei giardini e luoghi abita...

Culbianco
Oenanthe oenanthe

Maschio con dorso, vertice e fronte...
sopracciglio bianco, guance nere, par...
crema, groppone e base della coda...
della coda nero. La femmina è brun...
evidente sopracciglio giallastro e la...
maschio. Predilige le pianure, ma...
meridionale abita anche zone...

PASSERIFORMI
Turdidi
Monticola saxatilis
codirossone

codirossone



peso di ci...
trova in tutta...
a del nord.
e se gradisce
m., come il Ver...
anche di frutta e...
pletare almeno 2...
lle sue dimen...
di color...
iomi
ezza
gi...

inflastro
il più grande,
17 cm di lunghezza,
ismo sessuale
esperto,
biaditi.
di
pizzo
bianco.
l'Australia,
sarvarlo
zioni
na
ti,

RIFORMI
illidi
riza cia
muciatto

PASSERIFORMI
Fringillidi
Loxia curvirostra
crociere

PAS
Fri
Embe
zigolo giallo

RMI
idi
rinella
giallo

Handwritten tag with illegible text

zigolo giallo
Embe
EXT
6H2

CLOCIGLB

LOXIA CURVIROSTRA
IBLITBUTL
IMBODI

